



СУНИЦЯ САДОВА

Основні шкідники

2026 рік

ФАЗА РОЗВИТКУ	ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ	
Закінчення квітня – початок травня	ХРУЩ ЗАХІДНИЙ ТРАВНЕВИЙ (<i>Melolontha melolontha</i> L.), ХРУЩ СХІДНИЙ ТРАВНЕВИЙ (<i>Melolontha hippocastsni</i> Fabr. L.), ХРУЩ ЧЕРВНЕВИЙ (<i>Amplimallon solstitialis</i> L.), ХРУЩ МАРМУРОВИЙ (<i>Polyphylla fullo</i> L.), ХРУЩ ВОЛОХАТИЙ (<i>Anoxia pilosa</i> Fabr.) Жуки грубо об'їдають листя, личинки обгризають кореневу систему, що призводить до сильного зрідження. Рослини нерідко гинуть	
	ВОВЧОК ЗВИЧАЙНИЙ АБО КАПУСТЯНКА (<i>Gryllotalpa Gryllotalpa</i> L.) Пошкоджує коріння рослин	
Травень – початок відростання «розеток»	ДОВГОНОСИК МАЛИНОВО-СУНИЧНИЙ (<i>Anthonomus rubi</i> Hrbst.) Пошкоджує малину, ожину, суницю, троянду, шипшину. Спочатку жуки живляться листками, вигризаючи в них отвори, потім переходять на бутони і виїдають їхній вміст. Бутони засихають	
	СКОСАР МАЛИЙ ЧОРНИЙ (<i>Otiorrhynchus ovatus</i> L.) Личинки пошкоджують кореневу систему: малі корінці з'їдають повністю, а з великих обгризають кору	
	ЛИСТОЇД СУНИЧНИЙ (<i>Pyrhalta tenella</i> L.) Жуки скелетують листя і прогризають у них звичайні отвори. Личинки скелетують листя	
	ДОВГОНОСИК СІРИЙ АБО ЗЕМЛИСТИЙ КОРЕНЕВИЙ (<i>Sciaphilus asperatus</i> Bousa.) Завдає великих збитків суничним плантаціям, викликаючи масову загибель рослин. За відсутності дощів у червні — липні сильно пошкоджені плантації суниць повністю засихають, а непошкоджені суниці в період посухи дають хороший урожай	

ФАЗА РОЗВИТКУ	ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ	
Червень – серпень	ЛИСТОВІЙКА СУНИЧНА (<i>Ancylis comptana</i> Frel.) Гусениці скелетують молоді листки навколо середньої жилки, оповиваючи їх білою павутиною	
	ТРАЧ ОПЕРЕЗАНИЙ СУНИЧНИЙ (<i>Emphytus cinctus</i> L.) Личинки молодших віків скелетують листки з нижнього боку, середніх віків — вигризують отвори, останнього віку — обгризають листки з країв. Молоді листки з'їдають повністю	
	ТРАЧ ГРЕБІНЧАСТОВУСИЙ СУНИЧНИЙ (ТРОЯНДОВИЙ) (<i>Cladius pectinicornis</i> Ceoff.) Личинки скелетують листя, виїдаючи візерункчасті ділянки, потім дірки	
	ПОПЕЛИЦЯ МАЛА КОРЕНЕВА СУНИЧНА (<i>Aphis forbesi</i> Weed.), ПОПЕЛИЦЯ СУНИЧНА (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>) Живиться соками кореневої системи. Попелиці – переносники комплексу вірусів. Кущі суниці відстають у рості, мають бліде листя, квітки та ягоди часто недорозвинені	
	КЛІЩ ЗВИЧАЙНИЙ ПАВУТИННИЙ (<i>Tetranychus urticae</i> Koch.) Кліщі руйнують епідерміс листка, порушують фізіологічні функції. Листя скручується і всихає. Пошкоджена павутинними кліщами рослина покривається павутиною. Листя деформується, стає зморшкуватим і схожим на перекинтий човен. Знизу листя знебарвлюється і біліє, а зверху – жовтіє і стає шорстким, прожилки коротшають і викривляються. Часто здається, що кущ уражений вірусним захворюванням. Присутність шкідника на стовбурі свідчить про запущену стадію зараження. Уся рослина вкривається павутиною, листя опадає, цвітіння і розвиток бутонів зупиняється	 
	СЛИМАК ПОЛЬОВИЙ (<i>Agriolimax agrestis</i> L.) Найбільше шкодить суниці в період досягання ягід. Впродовж сонячного дня слимаки ховаються під грудками землі, опалим листям, знаряддям, а вночі переходять на рослини і живляться листям та ягодами. Пошкоджені ягоди швидко уражуються збудником сірої гнилі. Надзвичайно висока шкідливість слимаків у роки із значною кількістю опадів	 

Навчання та готові рішення



Інститут захисту рослин НААН

Поштова адреса:

вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022, Україна

Тел.: +38 (044) 257-11-24; **E-mail:** plant_prot@ukr.net

Сайт: <http://ipp.gov.ua>

