

СУНИЦЯ САДОВА

Сучасна концепція інтегрованого захисту суниці садової в умовах зміни клімату

2026 рік

Строки виконання заходів	Шкідливі об'єкти	Запобіжні заходи, особливості застосування, умови, що визначають ефективність
ПІДГОТОВКА ПОЛЯ ТА ВИСАДЖУВАННЯ СУНИЦІ		
Серпень – жовтень	Пирій повзучий, однорічні злакові та дводольні бур'яни	Дискування або оранка на глибину залягання основної маси кореневищ та кореневих розгалужень
Закінчення квітня – початок травня (закладання плантацій)	Личинки західного та східного травневих хрущів, коваликів (дротяники), сисні та листогризучі види	За закладання плантацій один із інсектицидів – Круїзер 350 FS, TH (200–250 мл/10 л води), Престиж 290 FS, TH (200–250 мл/10 л води). За висаджування розсади суніці механізованим способом – вносити гранульований інсектицид Форс 1,5 G, ГР (10–12 кг/га) у лунки (в рядок)
Закінчення травня – середина червня	Совка озима	Випуск трихограми совко-вогнівкової форми в чотири прийоми з інтервалом 4–6 діб по 50–60 тис. шт./га
Червень – липень – серпень	Довгоносик кореневий земляний, малиново-суничний довгоносик-квітоїд, скосар малий чорний, листоїд суничний, трачі, листовійка сунична, мала коренева сунична попелиця, кліщі (звичайний павутинний, суничний), борошниста роса, біла і бура плямистості	За перевищення ЕПШ обприскування інсектицидами : Вертимек 018 EC, KE (0,5–1 л/га), Каліпсо 480 SC, KC (0,3 л/га); акарицидами – Енвідор 240 SC, KC (0,4–0,6 л/га), Актеллік 500 EC, KE (0,6 л/га). Біопрепарати проти збудників хвороб: Серенада АСО SC, KC (4–8 л/га), Бесткур, РК ВГ (1,0–1,5 л/га), Поліверсум (Poliversum), п. (0,1–0,2 кг/га), Тагеро WP, ЗП (0,18–0,37 кг/га). Фунгіцидами проти борошнистої роси та плямистостей – Хорус 75 WG, ВГ (0,7 кг/га) та повторно через 20–25 діб (0,4 кг/га), Луна Сенсейшен 500 SC, KC (0,4 л/га) та повторно через 20–25 діб (0,6 л/га)
Закінчення серпня – початок вересня	Личинки західного та східного травневих хрущів, коваликів (дротяники), сисні та листогризучі види, кліщ суничний, стеблова нематода	За закладання плантацій проти личинок хрущів, коваликів (дротяники), сисних та листогризучих видів – один із інсектицидів (викладено вище). Термічно знезаражувати від суничного кліща надземну частину розсади суніці слід у гарячій воді за температури +45–46°C впродовж 12–13 хв
Осінньо-зимовий період (листопад – лютий)	Мишоподібні гризуни	Розкладання в нори отруєних принад (із розрахунку один брикет на нору) на основі препарату Шторм, 0,005% воскові брикети, ПБ; Мишливець, ПР; Талон RB, ПБ воскові брикети та біопрепарату родентицидної дії Родента БІО (бактороденцид вологий зерновий-супер), зернова принада (1–2 кг/га)

Строки виконання заходів	Шкідливі об'єкти	Запобіжні заходи, особливості застосування, умови, що визначають ефективність
НА ПОЛЯХ НАСАДЖЕНЬ СУНИЦІ 2-3-го років		
Квітень – перед відростанням «розеток» ВВСН 10-12	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування насаджень гербицидом Тореро, КС (2 л/га) у фазу бур'янів «сім'ядолі – перша пара справжніх листків»
Травень – початок відростання «розеток» ВВСН 10-13	Шкідники (довгоносики, скосарі, листоїди), хвороби	Обприскування інсектицидами Актеллік 500 ЕС, КЕ (0,6 л/га) чи Каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га) Біопрепарати проти хвороб: Серенада АСО SC, КС (4-8 л/га), Бесткур, РК ВГ (1,0-1,5 л/га), Поліверсум (Poliversum), п. (0,1– 0,2 кг/га), Тагеро WP, ЗП (0,18–0,37 кг/га)
Травень – перед цвітінням – цвітіння ВВСН 55-67	Оленка волохата, інші види бронзівок, довгоносик-квіткоїд малиново-суничний, скосарі (малий чорний та люцерновий), хвороби (борошниста роса, біла та бура плямистості)	Проти оленки волохатої та інших видів бронзівок Каліпсо 480 SC, КС (0,3 л/га). Перед цвітінням проти кліщів: Енвідор 240 SC, КС (0,4–0,6 л/га), Вертимек 018 ЕС, КЕ (0,5–1 л/га). Біопрепарати проти хвороб: Серенада АСО SC, КС (4-8 л/га), Бесткур, РК ВГ (1,0-1,5 л/га), Поліверсум (Poliversum), п. (0,1– 0,2 кг/га), Тагеро WP, ЗП (0,18–0,37 кг/га)
Закінчення травня – початок червня ВВСН 65-67	Совка озима	Випуск трихограми совко-вогнівкової форми в чотири прийоми з інтервалом 4–6 діб по 50–60 тис. шт./га
Після цвітіння – початок формування ягід ВВСН 73-87	Гнилі ягід, борошниста роса, біла та бура плямистості	Біопрепарати Серенада АСО SC, КС (4–8 л/га), Бесткур, РК ВГ (1–1,5 л/га), Поліверсум (Poliversum), п. (0,1– 0,2 кг/га), Тагеро WP, ЗП (0,18–0,37 кг/га)
Після збирання врожаю ВВСН 91-93	Збудники хвороб, кліщі. Запобігання поширенню нематод Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Проти збудників хвороб (наведено вище). Проти кліщів – Енвідор 240 SC, КС (0,4–0,6 л/га), Вертимек 018 ЕС, КЕ (0,5–1 л/га) Внесення біонематоцидів – Нематофагін або MetaRiz (MetaPiz) 5–10 л/га для поливу або 100–200 мл на 10 л води для замочування розсади Обприскування гербицидом Тореро КС (2 л/га) за висоти бур'янів 10–15 см



Навчання та готові рішення



Інститут захисту рослин НААН

Поштова адреса:

вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022, Україна

Тел.: +38 (044) 257-11-24; **E-mail:** plant_prot@ukr.net

Сайт: <http://ipp.gov.ua>