

# ЯБЛУНЯ

## Основні шкідники яблуні

2026 рік

| <b>ФАЗА<br/>РОЗВИТКУ<br/>ЯБЛУНІ</b>                                                           | <b>ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Початок<br/>розпускання<br/>бруньок<br/>(«зелений<br/>конус» –<br/>«мишачі<br/>вушка»)</b> | <b>КВІТКОЇД ЯБЛУНЕВИЙ</b><br><i>Anthonomus pomorum</i> Linnaeus<br>Жуки живляться бруньками, вигризаючи в них отвори. Пошкоджені бруньки не розкриваються або засихають                       |    |
|                                                                                               | <b>ДОВГОНОСИК СІРИЙ БРУНЬКОВИЙ</b><br><i>Sciaphobus squalidus</i> Gyll.<br>Пошкодження бруньок і молодих листків, що затримує розвиток дерев                                                  |    |
|                                                                                               | <b>КЛІЩ ЧЕРВОНИЙ ПЛОДОВИЙ</b><br><i>Panonychus ulmi</i> Koch<br>Личинки висмоктують сік із молодих листків, що призводить до їхнього світлішання                                              |    |
| <b>Перед<br/>цвітінням<br/>(«рожевий<br/>бутон»)</b>                                          | <b>КВІТКОЇД ЯБЛУНЕВИЙ</b><br><i>Anthonomus pomorum</i> Linnaeus<br>Самиці відкладають яйця в бутони. Личинки виїдають внутрішні тканини квіток. Бутони буріють, не розкриваються («ковпачки») |    |
|                                                                                               | <b>ПОПЕЛИЦЯ ЗЕЛЕНА ЯБЛУНЕВА</b><br><i>Aphis pomi</i><br>Молоді листки скручуються, пагони деформуються, вкриваються липкими виділеннями                                                       |    |
|                                                                                               | <b>ЛИСТОВІЙКИ</b><br><i>Tortricidae</i><br>Гусениці скручують листки у трубочки, живляться листям і бутонами                                                                                  |   |
| <b>Кінець<br/>цвітіння</b>                                                                    | <b>ПЛОДОЖЕРКА ЯБЛУНЕВА</b> (I покоління)<br><i>Cydia pomonella</i><br>Метелики відкладають яйця на листки та молоді плоди. Молоді гусениці починають вгризатися в зав'язь                     |  |
|                                                                                               | <b>ПОПЕЛИЦІ</b><br><i>Aphidoidea</i><br>Активне заселення молодих пагонів, пригнічення росту дерев                                                                                            |  |
|                                                                                               | <b>КЛІЩ ПАВУТИННИЙ</b><br><i>Tetranychus urticae</i> Koch<br>З'являються світлі крапки на листках, формується тонка павутина                                                                  |  |

| <b>ФАЗА<br/>РОЗВИТКУ<br/>ЯБЛУНІ</b>                                                                                    | <b>ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Формування<br/>плодів</b><br><br>   | <b>ПЛОДОЖЕРКА ЯБЛУНЕВА</b><br><i>Cydia pomonella</i><br>Гусениці проникають у плоди, виїдають насіннєву камеру. На плодах видно вхідний отвір та екскременти           |                                                                                        |
|                                                                                                                        | <b>ЩИТІВКА КАЛІФОРНІЙСЬКА</b><br><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst<br>Заселяє кору, пагони та плоди. Плоди вкриваються червоними плямами навколо місця живлення | <br> |
|                                                                                                                        | <b>МОЛІ МІНУЮЧІ</b><br><i>Yponomeutidae</i><br>Личинки утворюють світлі міни всередині листкової пластинки                                                             |                                                                                        |
| <b>Ріст<br/>плодів</b><br><br>         | <b>ПЛОДОЖЕРКА ЯБЛУНЕВА</b> (II покоління)<br><i>Cydia pomonella</i><br>Масове червивіння плодів, передчасне опадання яблук                                             |                                                                                        |
|                                                                                                                        | <b>КІЩ ПАВУТИННИЙ</b><br><i>Tetranychus urticae</i> Koch<br>Листки бронзовіють, засихають і передчасно опадають                                                        |                                                                                        |
|                                                                                                                        | <b>ЛИСТОВІЙКИ</b><br><i>Tortricidae</i><br>Пошкоджують листки та поверхню плодів, залишаючи вигризені ділянки                                                          |                                                                                       |
| <b>Достигання<br/>плодів</b><br><br> | <b>ПЛОДОЖЕРКА ЯБЛУНЕВА</b><br><i>Cydia pomonella</i><br>Червиві плоди втрачають товарні якості, масово опадають                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                        | <b>ТРАЧІ ОСОПОДІБНІ ТА ЛИСТОВІЙКИ</b><br><i>Tenthredinoidea</i><br>Пошкодження плодів сприяє проникненню збудників плодової гнилі                                      |                                                                                      |
|                                                                                                                        | <b>ЩИТІВКА КАЛІФОРНІЙСЬКА</b><br><i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst<br>Погіршується якість плодів та ослаблюється дерево перед зимівлею                          |                                                                                      |

## Навчання та готові рішення



## Інститут захисту рослин НААН

### Поштова адреса:

вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022, Україна

**Тел.:** +38 (044) 257-11-24; **E-mail:** [plant\\_prot@ukr.net](mailto:plant_prot@ukr.net)

**Сайт:** <http://ipp.gov.ua>

