


ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ

Основні шкідники

2026 рік

ФАЗА РОЗВИТКУ	ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ	
Березень – квітень, фаза «набрякання бруньок» (за температури повітря не вище +5°C)	КЛІЩІ: ГОРІХОВИЙ БРУНЬКОВИЙ <i>(Phytoptus avellanae</i> Nal., <i>Eriophyes corylogallarum</i>), ГОРІХОВИЙ ПОВСТЯНИЙ <i>(Aceria erinea</i> (Nal), БОРОДАВЧАСТИЙ <i>(Aceria tristriatus</i> (Nal.), ЛІЩИНОВИЙ ЛИСТКОВИЙ <i>(Tegonotus derpessus</i> (Nal.), ЧЕРВОНИЙ ПЛОДОВИЙ КЛІЩ <i>(Panonnychus ulmi</i> Koch.) Личинки, німфи та дорослі особини кліщів висмоктують клітинний сік з листків. Спостерігаються коричневі плями на листі. На волоському горіху, найчастіше на верхній стороні утворюються горбаті опуклості – гали, зісподу – глибокі западини. Листя усихає і опадає. Ріст гілок припиняється. Луски бруньок ущільнені, а самі бруньки збільшуються в розмірах, до початку літа вони всихають і опадають	 
	ЩИТІВКА КАЛІФОРНІЙСЬКА <i>(Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.) Пошкоджує штамби дерев, гілки, листя, плоди. На пошкоджених ділянках дерев розтріскується кора, викривляються пагони, висихають окремі гілки, деформується і опадає листя. На плодах у місцях живлення утворюються червоні плями	 
Квітень – травень, під час «розпукування бруньок»	ПОПЕЛИЦЯ ГОРІХОВА ВЕРХНЯ <i>(Callaphis juglandis</i> Goeze), ПОПЕЛИЦЯ ГОРІХОВА НИЖНЯ <i>(Chromaphis juglandicola</i> Kalt.) У пошкоджених пагонів уповільнюється ріст, спостерігається передчасний листопад, зниження якості плодів, підмерзання рослин. На медвяній росі поселяються сажкові гриби	
Травень – початок червня та за показниками феромонних пасток	ПЛОДОЖЕРКА ЯБЛУНЕВА <i>(Carpocapsa pomonella</i> L.) та ПЛОДОЖЕРКА ГОРІХОВА <i>(Carpocapsa amplana</i> Hb.) Вхідний отвір і ходи гусениці заповнюють бурими сухими екскрементами. Пошкоджені плоди передчасно опадають чи залишаються на дереві	 
	ЛИСТОВІЙКА РІЗНОКОЛЬОРОВА ПЛОДОВА <i>(Acleris variegana</i> Den. U Schiff.) Гусениці пошкоджують бруньки, листя, оповиваючи їх павутиною і стягуючи в клубки, живляться між двома листками	

ФАЗА РОЗВИТКУ	ШКІДНИК, ШКІДЛИВІСТЬ	
Травень – початок червня та за показниками феромонних пасток	ЛИСТОВІЙКА МІНЛИВА ПЛОДОВА (<i>Hedya nubiferana</i> Haw.) Гусениці грубо об'їдають бруньки, бутони, скелетують нижню частину листової пластинки	
	МІЛЬ ХУДА ГОРІХОВА (<i>Caloptilia roscipennella</i> Hbn.) На листках видовжені міні, кінець листка скручений у трубочку	
	ЧЕРВИЦЯ В'ІДЛИВА (<i>Zeuzera pyrina</i> L.) і ПАХУЧА (<i>Cossus cossus</i> L.) Гусениці влаштовують ходи в черешках листків і пагонах, спричиняючи їх висихання. Пошкоджені гілки обламуються, в разі значних пошкоджень дерева висихають	
	ГОРБАТКА БУЙВОЛОВИДНА (<i>Stictocephala bubalus</i> F.) На тонких гілках та штамбах молодих дерев помітні парні поздовжні надрізи кори і частково деревини у вигляді круглих дужок, з надрізів виділяється камедь, надалі кора темніє, відмирає і відстає, пагони і гілочки призупиняють ріст, гинуть	
II декада серпня та за показниками феромонних пасток	ДОВГОНОСИК ГОРІХОВИЙ (<i>Curculio nucum</i> L.) Пошкоджують молоді листочки, у другій половині липня живляться горіхами, роблячи за допомогою головотрубки тонкі, але глибокі уколи. Личинки проточують у сім'ядолях ходи	
	ДОВГОНОСИК ЖОЛУДЕВИЙ (<i>Curculio glandium</i> L.) Пошкоджують молоді листочки, у другій половині липня живляться горіхами, роблячи за допомогою головотрубки тонкі, але глибокі уколи. Личинки проточують у сім'ядолях ходи	
	БУСАЧ ЛІЩИНОВИЙ (<i>Oberea linearis</i> L.) Самиця надгризає кору над місцем кладки, пагін всихає і ламається. Личинки проточують поздовжні ходи в деревині молодих гілок. Верхні листки на пагонах жовтіють, засихають, скручуються. Характерна ознака заселення вусачем — надламаний або висячий на рештках кори пагін. Заселяє гілки, тонкі штабики, молоді пагони	

Навчання та готові рішення



Інститут захисту рослин НААН

Поштова адреса:

вул. Васильківська, 33, м. Київ, 03022, Україна

Тел.: +38 (044) 257-11-24; **E-mail:** plant_prot@ukr.net

Сайт: <http://ipp.gov.ua>

